ASPANIF
Ezpain-ahosabaiko arraildura duten haurren familien elkartea · Euskadi

IKERKETA · ERDITZE AURREKO DIAGNOSTIKOA

Haurdunaldiko ekografiak ezpain-ahosabaiko arraildura detektatzeko aukera ematen du bigarren hiruhilekotik aurrera

11 ikerketaren berrikuspen integratzaile batek ondorioztatu du ekografia erabilgarria dela ezpain- eta aho-sabaiko arraildurak diagnostikatzeko, haurdunaldiko bigarren hiruhilekotik aurrera, nahiz eta ez den guztiz zehatza den proba bat. Diagnostiko goiztiar batek aukera ematen die familiei informatzeko eta prestatzeko.

2026ko azaroaren 10a · ASPANIF



Erditze aurreko ekografia; geziak ezpain-arraildura eta aho-sabaiko arraildura seinalatzen ditu. Irudia «Jallite» sinadurarekin.

Zer dio ikerketak

2022an *Research, Society and Development* aldizkarian argitaratutako berrikuspen integratzaile batek aztertu du ekografiak zer-nolako zeregina duen ezpain- eta aho-sabaiko arraildurak erditze aurretik diagnostikatzean. Egileek (Victor Ferreira Antunes, Anderson Andrade Wanderley eta Ana Maria Guerra Costa, Centro Universitário Mario Pontes Jucá) PubMed, Embase, Scopus, Web of Science eta Cochrane Library datu-baseetan bilatu zituzten azken hamar urteetako ikerketak, eta 11 lan hautatu zituzten.

Guztiek erakutsi zuten ekografia erabilgarria dela malformazio horiek detektatzeko **haurdunaldiko bigarren hiruhilekotik aurrera**. Egileek argitzen dute metodoak ez duela zehaztasun osoa, baina diagnostikoan laguntzen duela.

Zer esan nahi du familientzat

Informatzeko eta prestatzeko denbora

Erditu aurretik jakiteak haurrak arraildura duela aukera ematen dio familiari informazioa jasotzeko, haurra artatuko duen taldea ezagutzeko eta lehen egunetik zaintzak planifikatzeko, adibidez elikadura.

Detekzioa ez da beti posible

Ekografiak ez ditu arraildura guztiak beti detektatzen. Estatu Batuetako Hortz eta Garezur-aurpegiko Ikerketa Institutu Nazionalaren (NIDCR) arabera, ezpain-arraildura (labio leporino) ohiko ekografia batean diagnostika daiteke, baina aho-sabaiko arraildura mota batzuk ez dira erraz ikusten eta geroago diagnostika daitezke. **Ekografia batek arraildurarik erakusten ez badu, horrek ez du erabat baztertzen.**

2024ko berrikuspen sistematiko batek (18 ikerketa) jasotzen du 2D ekografiaren sentsibilitatea %43 eta %91 artekoa dela, arraildura motaren arabera, eta zehaztasuna batez ere erabilitako teknikaren araberakoa dela. Aurpegiko hezurren itzal akustikoak, haurraren posizioak, likido amniotikoaren urriak edo amaren obesitateak ikustea zaildu dezakete, batez ere aho-sabaia.

Zein astetan ikus daiteke?

Espainiako Ginekologia eta Obstetrizia Elkartearen (SEGO) lehen hiruhilekoko ekografiaren gidak (11 aste eta 6 egun arte) goiko ezpaina baloratzea jasotzen du, «posible bada», eta dio detekzioa taldearen, miaketa egiten duenaren esperientziaren eta eskuragarri dagoen denboraren araberakoa dela. Bigarren hiruhilekoan, 2024ko berrikuspenean aztertutako 2D ekografiari buruzko ikerketek 18 eta 23 aste artean egiten dute.

Diziplina anitzeko taldearen zeregina

Ikerketak azpimarratzen du irudi-proba hauek diziplina anitzeko talde baten barruan interpretatu behar direla, haurraren jarraipen integrala eta humanizatua eskaintzeko.

Datu nagusiak

- **Ikerketa:** berrikuspen integratzailea, 11 ikerketa barne.
- **Emaitza:** ekografia erabilgarria da ezpain- eta aho-sabaiko arraildurak detektatzeko bigarren hiruhilekotik aurrera.
- **Muga:** ez da guztiz zehatza den metodoa; aho-sabaiko arraildura isolatua zailagoa da ikusten.
- **Zehaztasuna:** 2D ekografiaren sentsibilitatea %43 eta %91 artekoa da, arraildura motaren eta teknikaren arabera (18 ikerketaren berrikuspen sistematikoa, 2024).
- **Maiztasuna Espainian (eskualdeko datua):** 10.000 jaiotzako 14 kasu inguru Asturiasen 1990 eta 2004 artean (700etik 1 inguru). Ez da estatuko datua.
- **Maiztasuna AEBn (CDC, NIDCRk aipatuta):** 1.050 jaioberritik 1 inguru ezpain-arrailduraz, aho-sabaiko arrailduraz edo gabe; eta 1.600etik 1 aho-sabaiko arraildura isolatuaz.

> **Haurdunaldian diagnostikoa jaso baduzu.** ASPANIFetik lagunduko zaitugu. Elkartearekin harremanetan jar zaitezke gauza bera bizi izan duten beste familia batzuekin hitz egiteko eta zalantzak argitzeko: informacion@aspanif.es · 620 84 15 67 · aspanif.es

Iturriak

1. Antunes VF, Wanderley AA, Costa AMG. Uso de la ecografía en el diagnóstico de fisuras labiales y palatinas durante el prenatal: una revisión integrativa. *Research, Society and Development*, 11(16), e34111637631, 2022 (CC BY 4.0). doi.org/10.33448/rsd-v11i16.37631
2. NIDCR. Labio leporino y paladar hendido (azken berrikuspena: 2024ko abendua). nidcr.nih.gov
3. Baeza-Pagador A, et al. Diagnostic Methods for the Prenatal Detection of Cleft Lip and Palate: A Systematic Review. *J Clin Med* 2024;13(7):2090. pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11012824
4. SEGO. Guía de la exploración ecográfica del I trimestre. *Prog Obstet Ginecol* 2022;65:240-290. sego.es
5. Rodríguez Dehli C, et al. Epidemiología de las fisuras labiales y palatinas durante los años 1990–2004 en Asturias. *An Pediatr* 2010;73(3):132-137. analesdepediatria.org

---

ASPANIFek prestatutako informazio orokorra: ez du zuen mediku-taldearen aholkua ordezkatzen. Zalantzarik izanez gero, kontsultatu beti berarekin.